

H28年12月

治療開始日	治療終了日	期間	所定疾患 傷病名	処置等の内容
12/26	12/31	6日	肺炎	KT39.6℃ Dr.聴診にて肺炎の診断 抗菌剤内服7日分投与 ノルフロキサシン(100)3ケ/日 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 0.4g 頓用
12/21	12/27	7日	肺炎	KT38.0℃ Dr.聴診にて肺炎の診断 抗菌剤内服7日分投与 ノルフロキサシン(100)3ケ/日 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 0.4g 頓用
12/29	12/31	3日	肺炎	KT38.6℃ Dr.聴診にて肺炎の診断 抗菌剤内服3日分投与 ノルフロキサシン(100)3ケ/日 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 0.4g 頓用
12/29	12/31	3日	肺炎	KT38.0℃ Dr.聴診にて肺炎の診断 抗菌剤内服3日分投与 ノルフロキサシン(100)3ケ/日 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 0.4g 頓用
12/15	12/21	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt : 38.0℃ 倦怠感 咳嗽 頭痛等の症状 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ* 検査 (陰性) 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/14	12/20	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt : 38.0℃ 倦怠感、咳嗽著明 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ* 検査 (陰性) 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/14	12/20	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt:38.2℃ 痰がらみ倦怠感 咳嗽著明 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ* 検査 (陰性) 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/15	12/21	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt:38.0℃ 咳嗽、倦怠感著明 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ* 検査 (陰性) 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/15	12/21	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt:38.5℃ 湿性咳嗽 鼻汁 (+) Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ* 検査 (陰性) 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/15	12/21	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt:38.0℃ 認知症高度にて 自覚症状得られず。咽頭痛 嗚声認める。 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ* 検査 (陰性) 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/15	12/21	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt : 38.0℃ 倦怠感 咳嗽 頭痛等の症状 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ* 検査 (陰性) 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

12/15	12/21	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt:37.6℃ 倦怠感 頭痛症状 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ ⁺ 検査 (陰性) 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/15	12/21	7日	肺炎 インフルエンザ疑	Kt : 38.3℃ 湿性咳嗽 倦怠感 頭痛(+) Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ ⁺ 検査 (陰性) 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/15	12/21	7日	肺炎	Kt:37.5℃ 咳嗽 倦怠感 咽頭痛 頭痛 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ ⁺ 検査 (陰性) 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/17	12/23	7日	肺炎	Kt:37.6℃ 頭痛 咽頭痛 咳嗽症状 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/17	12/23	7日	肺炎	Kt:38.3℃ ふらつき、下肢脱力感 頭痛 咽頭痛 症状 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/17	12/23	7日	肺炎	Kt:37.8℃ 認知症高度にて自覚症状得られず Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/18	12/24	7日	肺炎	Kt:37.5℃ 湿性咳嗽 頭痛症状 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/21	12/27	7日	肺炎	Kt:38.9℃ 湿性咳嗽 咽頭痛 頭痛あり Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ ⁺ 検査 (陰性) 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/18	12/24	7日	肺炎	Kt:37.5 再検 39.2℃ ↑ 頭痛 咽頭痛 湿性咳嗽あり Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ ⁺ 検査 (陰性) 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/18	12/24	7日	肺炎	Kt:37.5 Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ ⁺ 検査 (陰性) 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/18	12/24	7日	肺炎	Kt:37.5℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

12/18	12/24	7日	肺炎	Kt:38.4℃ 頭痛、湿性咳嗽 咽頭痛 ふらつきあり Dr 診察にて肺炎の診断 インフルエンザ検査（陰性） 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/18	12/24	7日	肺炎	Kt:38.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/18	12/24	7日	肺炎	Kt:38.0℃ 咳嗽 倦怠感 など症状あり Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H29年1月

1/5	1/11	7日	肺炎	KT39.2℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 RP)ノルフロキサシン(100)3T/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯用
1/11	1/17	7日	肺炎	KT38.2℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 RP)ノルフロキサシン(100)3T/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯用
1/11	1/17	7日	肺炎	KT38.5℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 RP)ノルフロキサシン(100)3T/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯用
1/9	1/15	7日	肺炎	KT38.4℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 RP)ノルフロキサシン(100)3T/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯用
1/8	1/14	7日	肺炎	KT38.4℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 RP)ノルフロキサシン(100)3T/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯用
1/8	1/14	7日	肺炎	KT37.5℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 RP)ノルフロキサシン(100)3T/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯用
1/15	1/21	7日	肺炎	KT38.5℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 Rp) ノルフロキサシン(100)3ヶ 3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 投与
1/16	1/22	7日	肺炎	KT38.0℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 Rp) ノルフロキサシン(100)3ヶ 3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 投与
1/26	1/31	6日	肺炎	KT38.0℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 6日分投与 Rp) ノルフロキサシン(100)3ヶ 3× 解熱剤外用ジクロフェナク (25) 1ヶ挿肛
1/26	1/31	6日	肺炎	KT38.3℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 6日分投与 Rp) ノルフロキサシン(100)3ヶ 3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 投与

1/27	1/31	5日	肺炎	KT38.3℃ Dr 聴診にて 肺炎の診断 抗生 5日分投与 Rp) ノルフロキサシ(100)3ヶ 3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 投与
1/29	1/31	3日	肺炎	KT37.7℃ Dr 聴診にて 肺炎の診断 抗生 3日分投与 Rp) ノルフロキサシ(100)3ヶ 3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 投与
1/17	1/23	7日間	肺炎	Kt : 39.1℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
1/6	1/12	7日間	肺炎	Kt:38.0℃前後発熱持続 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 アモキシシリン(250 mg) 3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
1/6	1/12	7日間	肺炎	Kt:38.0℃前後発熱持続 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 アモキシシリン(250 mg) 3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H29年2月

2/26	2/28	3日	肺炎	KT37.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
2/13	2/19	7日	肺炎	Kt : 37.0 台℃ 痰がらみ、 咽頭痛強し Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤鎮咳去痰剤 7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T レスブレン 3T 3×1 7T カルボシステン 3T 3×1 7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
2/13	2/19	7日	肺炎	Kt:38.0℃前後発熱持続 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
2/11	2/13	3日	肺炎	Kt:37.6℃咳嗽・鼻汁 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 3日分投与 ノルフロキサシ(100 mg) 3T 3×3T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用 2/13 インフルエンザ [※] 検査にて A型インフルエンザ判明。 インフルエンザ [※] 治療に変更 抗ウイルス剤タミフル 2ヶ/日 5T 抗生剤クラリスロマイシン 2ヶ/日 5T
2/14	2/19	6日	肺炎	Kt:37.6℃痰がらみ咳嗽 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシ(100 mg) 3T 3×7T 2/19 夜間急変 H.P 対応へ
2/14	2/20	7日	肺炎	Kt:39.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシ(100 mg) 3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
2/25	2/28	4日	尿路感染症	膿様の排尿あり、悪臭なし Dr 診察にて尿路感染症診断 ノルフロキサシ(100)3T 3×4T

H29年3月

3/1	3/7	7日間	肺炎合併	KT40.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
3/12	3/18	7日間	肺炎	KT38.8℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
3/24	3/30	7日間	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
3/27	3/31	5日間	肺炎	KT38.1℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
3/28	3/31	4日間	肺炎	KT38.1℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
3/14	3/20	7日	肺炎	KT38.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 クラリスロマイシン(200)2T 2×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
3/13	3/19	7日	肺炎	KT37.8℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H29年4月

4/9	4/15	7日	肺炎	KT37.9℃ 嘔吐(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服 7 日分投与 クラリスロマイシン(200) 2 T2× ノバミン(5)1T 屯用
4/20	4/26	7日	肺炎	KT38.1℃ 右手振戦(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
4/25	4/30	6日	肺炎	KT38.1℃ 湿性咳嗽(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服 6 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
4/21	4/27	7日	肺炎	KT37.4℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
4/7	4/13	7日	肺炎	Kt:38.0℃前後の発熱持続 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
4/9	4/15	7日	肺炎	Kt:38.5℃前後の発熱持続 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H29年5月

5/1	5/7	7日	肺炎	KT37.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 屯
5/2	5/8	7日	肺炎	KT38.2℃喘鳴,咳嗽(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 屯
5/3	5/9	7日	肺炎	KT37.6℃喘鳴,痰(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 屯
5/2	5/8	7日	肺炎	KT38.0℃ 咳嗽(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 屯
5/11	5/17	7日	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 屯
5/22	5/28	7日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 屯
5/6	5/12	7日	肺炎	KT38.4℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
5/8	5/14	7日	肺炎	KT37.5℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
5/11	5/17	7日	肺炎	KT38.6℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
5/22	5/26	5日	肺炎	KT37.7℃の発熱、下痢症状 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤・鎮痙剤5日分投与 クラリスロマイシ(200)2T 2×5T ブチルスコホ ラミン(10)2T2×5T

H29年6月

6/1	6/7	7日	肺炎	KT38.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
6/1	6/7	7日	肺炎	KT38.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯

6/2	6/8	7日	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服 7 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
6/1	6/7	7日	尿路感染症	KT36℃台 検尿 P(±)L(++) Dr 診察にて尿路感染の診断 抗生剤内服 7 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T3× ブスコパン 3T3×
6/5	6/9	5日	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服 5 日分投与 クラリスロマイシ(200)2T2× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
6/5	6/11	7日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤内服 7 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T3× 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
6/26	6/30	5日	尿路感染症	KT36℃台 検尿 P(++)L(++) Dr 診察にて尿路感染症の診断 抗生剤内服 5 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T3×
6/1	6/7	7日	肺炎	KT37.4℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H29年7月

7/6	7/12	7日	尿路感染症	肉眼的血尿(+) Dr 診察尿路感染症の診断 抗生剤、止血剤 7 日間投与 ノルフロキサシ(100)3ケ/日 トランサミン (250) 3ケ/日
7/12	7/18	7日	肺炎	KT38.2℃湿性咳嗽(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日間投与 ノルフロキサシ(100) 3ケ/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 投与
7/23	7/29	7日	肺炎	KT38.2℃湿性咳嗽(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日間投与 ノルフロキサシ(100)3ケ/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 投与
7/12	7/18	7日	急性肺炎	Kt:39.2℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
7/11	7/17	7日	急性肺炎	Kt:39.0℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
7/6	7/12	7日	肺炎	Kt:38.0℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
7/6	7/12	7日	肺炎	Kt:37.6℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7 日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

7/6	7/12	7日	誤嚥性肺炎	Kt:37.5℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノフロキシソン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
7/26	7/31	6日	肺炎	Kt:40.0℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノフロキシソン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
7/30	7/31	2日	肺炎	Kt:37.8℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノフロキシソン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H29年8月

8/6	8/12	7日	肺炎	KT39.1℃悪寒,戦慄(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 RP)ケリスロマイシン(200) 2T2× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与
8/24	8/30	7日	尿路感染症	KT36℃台頻尿 Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤 7日間投与 RP)ノフロキシソン(100)3T3×
8/24	8/30	7日	尿路感染症	KT36℃台排尿痛+ 検尿 P(++),L(++),pH8 Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤 7日間投与 RP)ノフロキシソン(100)3T3×
8/28	8/31	4日	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗菌剤 7日間投与 RP)ノフロキシソン (100)3T3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与
8/4	8/10	7日	肺炎	Kt:38.1℃の発熱 Dr 診察にて肺炎兼急性腸炎の診断 抗生剤 7日分投与 ケリスロマイシン(200)2T 2×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
8/1	8/7	7日	肺炎	Kt:37.1℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノフロキシソン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4
8/8	8/14	7日	肺炎	Kt:38.8℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノフロキシソン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4
8/10	8/16	7日	肺炎	Kt:37.1℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノフロキシソン(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4

H29年9月

9/7	9/13	7日	尿路感染症	肉眼的血尿(+) Dr 診察 尿路感染症の診断 抗菌剤 7日間投与 RP)ノフロキシソン(100) 3ヶ/日
9/26	9/30	5日	肺炎	KT37.8℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノフロキシソン(100) 3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与

9/27	9/30	4日	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシ(100) 3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
9/26	9/30	5日	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシ(100) 3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
9/27	9/30	4日	肺炎	KT38.6℃湿性咳嗽(+) Dr 診察にて肺炎の診断 喀痰多く嚥下出来ず内服 困難につき、 抗生剤点滴注射 3日間施行 パンスポリン 1g + 生食 100ml 2回/日 (朝・夕) 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
9/23	9/29	7日	尿路感染症 (出血性)	KT36.0℃台 血尿持続 (血清・コケラ) Dr 診察尿路感染症の診断 抗生剤・止血剤 7日分投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日 トランサミン(250)3cap/日
9/22	9/28	7日	肺炎	KT37.5℃の発熱 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシ(100)3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4

H29年10月

10/2	10/8	7日	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシ(100) 3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
10/5	10/11	7日	急性扁桃炎 (肺炎)	KT38.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシ(100) 3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
10/5	10/9	5日	尿路感染症	検尿 亜硝酸 (+) 潜血 (2+) 排尿時痛 (+) Dr 診察尿路感染症の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシ(100) 3ヶ/日 鎮痙剤ブチルスコパミン頓用
10/10	10/14	5日	肺炎	KT37.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 5日間投与 クラリスロマイシン(200) 2ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
10/11	10/17	7日	肺炎	KT38.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシ(100) 3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
10/10	10/16	7日	急性扁桃腺炎 (肺炎)	KT38.5℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシ(100) 3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
10/11	10/17	7日	肺炎	KT38.3℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与

10/13	10/19	7日	尿路感染症	KT36℃台排尿痛あり 検尿 P(+),L(+),pH6 Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日
10/19	10/25	7日	尿路感染症	血尿及び悪臭、膿尿 Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤・止血剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日 トランサミン(250)3cap/日
10/23	10/29	7日	尿路感染症	頻尿(+)残尿感(+)あり Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日
10/4	10/10	7日	肺炎	KT38.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4
10/26	10/31	6日	尿路感染症	KT36.0℃台 血尿持続 (血清・コウガラ様) Dr 診察尿路感染症の診断 抗生剤・止血剤6日分投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日 トランサミン(250)3cap /日
10/2	10/8	7日	肺炎	KT36.1℃ 湿性咳嗽 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日分投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4

H29年11月

11/2	11/8	7日	尿路感染症	悪臭尿にて検尿 尿潜血(3+)白血球(3+) Dr 診察尿路感染症の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日
11/9	11/15	7日	肺炎	KT39.1℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3ヶ/日 インフルエンザテスト(陰性)
11/6	11/12	7日	肺炎	KT38.2℃ 喀痰(+) Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 クラリスロマイシ(200)2ヶ/日 インフルエンザテスト(陰性)
11/6	11/8	3日	肺炎	Kt38.6℃ 喀痰(+) Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤3日間投与 クラリスロマイシ(200)2ヶ/日 インフルエンザテスト(陰性) 解熱見られず状態悪化の為他病院に入院へ
11/13	11/19	7日	肺炎	KT38.3℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 クラリスロマイシ(200)2ヶ/日 インフルエンザテスト(陰性)
11/17	11/23	7日	尿路感染症	排尿痛にて検尿施行 N(2+)H(2+)L(3+) Dr 診察尿路感染症の診断 抗生剤7日間投与 ノルフロキサシ(100)3T/日
11/16	11/22	7日	肺炎	KT38.5℃ 嘔気+嘔吐+ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤7日分投与 クラリスロマイシ(200)2ヶ/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

11/16	11/22	7日	急性扁桃炎 (肺炎)	KT36.1℃ 咽頭痛 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100) 3T/日 PL 顆粒 3T/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
11/20	11/26	7日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与 ノルフロキサシン(100) 3ヶ/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H29年12月

12/4	12/10	7日	肺炎	KT38.2℃喘鳴+ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗菌剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100)3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
12/5	12/11	7日	肺炎	KT37.7℃ 咳嗽あり Dr 聴診にて肺炎の診断 抗菌剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100)3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
12/8	12/14	7日	尿路感染症	排尿痛あり 検尿 N(+) PH6 Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100)3ヶ/日
12/8	12/14	7日	尿路感染症	肉眼的血尿 Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤、止血剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100)2ヶ/日 トランサミンカプセル 2c/日
12/16	12/22	7日	肺炎	KT39.6℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗菌剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100)3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
12/21	12/27	7日	肺炎	KT37.9℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗菌剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100)3ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4 投与
12/26	12/30	5日	肺炎	KT 38.4℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 5日分投与 クラリスロマイシン (200) 2ヶ/日 発熱時アセトアミノフェン 0.4g頓用
12/4	12/10	7日	肺炎	KT38.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与開始 (ノルフロキサシン(100) 3×1 T) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/4	12/10	7日	肺炎	KT38.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与開始 (ノルフロキサシン(100) 3T) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/1	12/7	7日	帯状疱疹	左臀部～左腰部にかけてヘルペス湿疹出現 Dr 診察 帯状疱疹の診断。抗ウイルス剤点滴注射 5日間 生食 100ml+アシクロビル 250mg10ml 患部に抗ウイルス剤 (ヒダラビン軟膏) 継続塗布
12/5	12/11	7日	肺炎	KT39.3℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日分投与開始 (ノルフロキサシン(100) 3T 3×1) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

12/27	12/31	5日	肺炎	KT37.8℃ 咳嗽 (+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 5日分投与開始 (ノフロキサシ(100) 3T 3×1) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
12/27	12/31	5日	肺炎	KT36.1℃ 咳嗽 (+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 5日分投与開始 (ノフロキサシ(100) 3T 3×1) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H30年1月

1/26	1/31	6日	尿路感染症	血尿顕著 Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤、止血剤 6日分投与 ノフロキサシ(100)2錠 2× トランサミンカフセル 2c 2×6日間
1/29	1/31	3日	肺炎	KT38.5℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗菌剤 3日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T 3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与
1/5	1/11	7日	尿路感染症	排尿時痛 Dr 診察尿路感染症の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T3×
1/5	1/11	7日	肺炎	KT37.1℃ 鼻閉(+) Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T 3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与
1/5	1/11	7日	肺炎	KT37.5℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T3×
1/5	1/9	5日	尿路感染症	血尿とそれに伴う悪臭 抗生剤・止血剤 5日分投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T 3× トランサミンカフセル 3c 3×
1/8	1/12	5日	肺炎	KT39.0℃ 検尿 OB Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T 3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与 1/12 胸部 X線検査にて滲出性肺炎疑いの為転医へ
1/29	1/31	3日	肺炎	KT37.6℃ 喘鳴 (+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与
1/18	1/18	1日	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 1日分投与開始 クラリスロマイシン (200) 2T/日 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用 104歳と超高齢。1/18深夜急変し、翌1/19死亡退所

1/5	1/11	7日	肺炎	KT37.0℃咳嗽、喀痰多し Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 去痰剤 7T 分投与開始 クラリスロマイシン 2T(200) 2×1 カルボシステイン (250)3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
1/21	1/27	7日	肺炎	KT37.1℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 去痰剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシ 3T(100) 3×1 カルボシステイン (250)3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
1/5	1/11	7日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H30年2月

2/9	2/15	7日	肺炎	KT37.7℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗菌剤 7日間投与 Rp)ノルフロキサシ(100)3T 3×分 熱発時アセトアミノフェン 0.4 頓用
2/1	2/7	7日	尿路感染症	血尿多量に認む KT36℃台 Dr 診察 尿路感染症の診断 抗生剤、止血剤 7日間投与 Rp)クラリスロマイシン(200)2T/日 トランサミン (250) 2T/日
2/2	2/8	7日	尿路感染症	数日來血尿持続 排尿時痛 (+) Dr 診察 尿路感染症の診断 抗生剤、安定剤 7日間投与 Rp)ノルフロキサシ(100)2T/日 エチゾラム(0.5)2T/日
2/4	2/10	7日間	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用 インフルエンザ [※] 検査(陰性)
2/19	2/25	7日間	肺炎	KT38.5℃咳嗽 (+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 クラリスロマイシン 2T(200) 2×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用 インフルエンザ [※] 検査(陰性)
2/1	2/7	7日間	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用 インフルエンザ [※] 検査(陰性)
2/5	2/11	7日間	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用 インフルエンザ [※] 検査(陰性)

H30年3月

3/4	3/5	2日	肺炎	KT38.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノルフロキサシ(100)3T 3× <u>3/5 退所</u>
3/2	3/5	4日	肺炎	KT39.0℃悪寒(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 4日間投与 Rp)ノルフロキサシ(100)3T 3×

3/7	3/13	7日	尿路感染症(膀胱炎)	KT38.6℃肉眼的血尿(+) Dr 診察 尿路感染症の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)クラリスロマイシン(200)2T×2
3/17	3/23	7日	肺炎	KT39.1℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T 3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与
3/19	3/25	7日	肺炎	KT38.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 Rp) クラリスロマイシン(200)2T×2 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与
3/15	3/21	7日	肺炎	食思不振(+), 喀痰(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T 3× 熱発時アセトアミノフェン 0.4 投与
3/5	3/11	7日間	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H30年4月

4/8	4/14	7日	肺炎	Kt38.8℃ 悪寒(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ステロイド剤 3日投与 Rp)ノフロキサシ(100) 3T×3 ブレイブロン(5) 2T×2
4/19	4/25	7日	尿路感染症	肉眼的血尿+ Dr 診察 尿路感染症の診断 抗生剤・止血剤 7日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T×3 トランサミン(250)2T×2
4/17	4/21	5日	肺炎 (急性気管支炎)	Kt37.3℃ 嘔気・嘔吐(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 5日間投与 吐き気止め 5日間投与 Rp)クラリスロマイシン(200)2T×2 プリンペラン(5)2T×2 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
4/20	4/24	5日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 5T 分投与開始 クラリスロマイシン T(200) 2×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
4/27	4/30	4日	肺炎	KT37.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
4/4	4/10	7日	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
4/11	4/17	7日	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H30年5月

5/28	5/31	4日	肺炎	KT37.8℃ Dr診察にて肺炎の診断 抗生剤4T分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
5/27	5/31	5日	肺炎及び 尿路感染症	KT37.6℃ Dr診察にて肺炎及び 尿路感染症の診断 抗生剤5T分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用 検尿にて 亜硝酸 2+蛋白 2+潜血 2+ 白血球 3+ 尿路感染症の診断追加
5/9	5/15	7日	肺炎	KT38.3℃ Dr診察にて肺炎の診断 抗生剤7T分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
5/22	5/26	5日	肺炎	KT37.1℃ 咽頭痛 頭痛 Dr診察にて肺炎の診断 抗生剤5T分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
5/11	5/17	7日	尿路感染症	肉眼的血尿+ 亜硝酸+蛋白+潜血++ 白血球+++ Dr診察:尿路感染症の診断 抗生剤止血剤7日間投与 RP)ノルフロキサシン 3T3×1 トランサミン 3T3×1
5/11	5/17	7日	尿路感染症	尿臭+ 蛋白+-白血球+++ Dr診察:尿路感染症の診断 抗生剤7日間投与 RP)ノルフロキサシン 3T3×1
5/11	5/17	7日	尿路感染症	尿臭+++白血球+++ Dr診察:尿路感染症の診断 抗生剤7日間投与 RP)ノルフロキサシン 3T3×1
5/4	5/10	7日	肺炎	Kt39.4℃ 嘔気・嘔吐 (+) Dr診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 Rp)ノルフロキサシン(100)3T×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓
5/8	5/14	7日	肺炎	Kt39.0℃ 検尿白血球++ Dr診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 Rp)ノルフロキサシン(100)3T×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓
5/14	5/20	7日	尿路感染症	検尿 亜硝酸 (+) 白血球(卍) 潜血 (卍) Dr診察:尿路感染症の診断 抗生剤7日間投与 RP)ノルフロキサシン(100)3T3×1
5/19	5/25	7日	肺炎	Kt37.4℃ Dr診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 Rp)ノルフロキサシン(100)3T×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓
5/24	5/30	7日	肺炎	Kt38.9℃ Dr診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 Rp)ノルフロキサシン(100)3T×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓
5/25	5/31	7日	肺炎	Kt39.1℃ Dr診察にて肺炎の診断 抗生剤7日間投与 クラリスロマイシン(200)2T 2×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓
5/25	5/29	5日	肺炎 気管支喘息	Kt38.2℃ Dr診察にて肺炎の診断 Rp)ノルフロキサシン(100)3T 3× プレドニゾロン(5) 2錠2× カルボシステイン(200)2錠2×5T
5/25	5/31	7日	肺炎	Kt38.4℃ Dr診察にて肺炎の診断 ノルフロキサシン(100) 3T 3×7T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓

H30年6月

6/9	6/15	7日	尿路感染症	KT38.0℃ 血尿+ Dr 診察 尿路感染症の診断 抗生剤止血剤 7日間投与 Rp)ノルフロキサシン 3T3×1 トランサミン 3T3×1
6/18	6/24	7日	肺炎	KT39.2℃ Dr 聴診にて肺炎の診断 抗生剤、去痰剤 7日間投与 Rp) クラリスロマイシン(200)2T2×1 カルボシステイン 2T 2×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4g 頓 適時の酸素吸入処置
6/27	6/30	4日	尿路感染症	KT38.0℃ 下腹部痛 バルカテーテル留置中 局所のイテリ(+) Dr 診察 尿路感染症の診断 抗生剤 7日間投与 Rp)ノルフロキサシン(100)3T3×1 解熱剤 アセトアミノフェン 0.4g 頓
6/3	6/9	7日	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
6/15	6/21	7日	肺炎	KT38.8℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
6/10	6/16	7日	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 クラリスロマイシン 2T(200) 2×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
6/17	6/23	7日	肺炎	KT38.1℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H30年7月

7/5	7/11	7日	肺炎	KT38.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
7/9	7/15	7日	肺炎	KT37.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
7/9	7/15	7日	尿路感染症	KT37.6℃ Dr 診察にて 尿路感染症の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 検尿にて 亜硝酸— 白血球 2+
7/12	7/18	7日	肺炎	KT38.4℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
7/7	7/13	7日	肺炎	KT38.7℃ 顔面紅潮 Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 (ノルフロキサシン(100)3T3×) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯

7/10	7/16	7日	尿路感染症	尿悪臭 (+) 検尿 亜硝酸 (+) Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤 7日間投与 (ノフロキサシ(100)3T3×)
7/10	7/16	7日	尿路感染症	尿悪臭 (+) 検尿 亜硝酸 (+) Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤 7日間投与 (ノフロキサシ(100)3T3×)
7/12	7/18	7日	尿路感染症	KT38.4℃ 脱力感あり 検尿 亜硝酸 2+ 尿蛋白+ 白血球+ Dr 診察尿路感染症の診断 抗菌剤 7日間投与 (ノフロキサシ(100)3T3×) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯

H30年8月

8/17	8/23	7日	肺炎	KT37.5℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
8/17	8/23	7日	肺炎	KT37.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノフロキサシ 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
8/1	8/7	7日	尿路感染症	KT37.2℃ 顔面紅潮 Dr 診察:尿路感染症の診断 抗生剤 7日間投与 (ノフロキサシ(100)3T3×) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
8/3	8/9	7日	尿路感染症	KT38.1℃ 尿検査(亜硝酸+、白血球+) Dr 診察:尿路感染症の診断 抗生剤 7日間投与 (ノフロキサシ(100)3T3×) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
8/6	8/12	7日	肺炎	KT38.5℃ 湿性咳嗽(+) Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 (ノフロキサシ(100)3T3×) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
8/13	8/19	7日	肺炎	KT38.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 (クラリスロマイシン(200)2T2×) 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 屯
8/17	8/23	7日	尿路感染	KT36.8℃ 検尿施行 N: (2+) L: (+) PH:(6) Dr 診察: 尿路感染症の診断 抗生剤 7日間投与 (ノフロキサシ(100)3T3×)7T

H30年9月

9/16	9/22	7日	肺炎	KT39.2℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/17	9/23	7日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/19	9/23	5日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 クラリスロマイシン 2T(200) 2×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/20	9/26	7日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/15	9/21	7日	肺炎	KT38.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/1	9/7	7日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/6	9/10	5日	肺炎	KT37.5℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 5T 分投与開始 クラリスロマイシン 2T(200) 2×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/5	9/11	7日	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/8	9/14	7日	肺炎	KT37.5℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/8	9/14	7日	肺炎	KT38.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/8	9/14	7日	肺炎	KT37.5℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/10	9/16	7日	肺炎	KT36.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/9	9/15	7日	肺炎	KT37.9℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 クラリスロマイシン 2T(200) 2×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/9	9/15	7日	肺炎	KT37.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

9/10	9/16	7日	肺炎	KT36.7℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
9/13	9/19	7日	肺炎	KT38.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H30年10月

10/4	10/10	7日	出血性尿路感染	血尿（淡血性様）パット内に認める KT 36.6℃ Dr 診察、出血性尿路感染症の診断 抗生剤、止血剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100)3T3×1 トランザミン (250) 3×1
10/22	10/28	7日	肺炎	KT38.4℃ Dr 診察 肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 クラリスロマイシン (200) 3×1 熱発時アセトアミノフェン 0.4g 頓用
10/20	10/26	7日	肺炎	KT39.0℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与開始 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用

H30年11月

11/6	11/12	7日	肺炎	咽頭痛あり 体温 36.5℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗菌剤 7T 分投与 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 SP トロチ適時投与
11/1	11/7	7日	肺炎	KT37.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗生剤 7T 分投与 クラリスロマイシン 2T(200) 2×1 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
11/1	11/7	7日	肺炎	喘鳴あり 体温 38.0℃ SpO2:96% Dr 診察にて肺炎の診断 抗菌剤 7T 分投与 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 ブレドニゾン(5) 2T 2×1/7T メブチンミニ 25μg 2T 2×1/5T 解熱剤アセトアミノフェン 0.4 頓用
11/22	11/28	7日	肺炎	咽頭痛あり 体温 36.6℃ Dr 診察にて肺炎の診断 抗菌剤 7T 分投与 ノルフロキサシン 3T(100) 3×1 SP トロチ希望時投与
11/15	11/21	7日	肺炎及び 尿路感染症	KT37.8℃ 尿検 N++ P+ Dr 診察 肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100) 3×1 熱発時アセトアミノフェン 0.4g 頓用
11/15	11/18	4日	肺炎	KT37.7℃ Dr 診察 肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100) 3×1 熱発時アセトアミノフェン 0.4g 頓用
11/26	11/30	5日	肺炎	KT37.8℃ Dr 診察 肺炎の診断 抗生剤 7日間投与 ノルフロキサシン(100) 3×1 熱発時アセトアミノフェン 0.4g 頓用

H30年12月

12/4	12/8	5日	肺炎	KT37.9℃ Dr診察 肺炎の診断 抗生剤5日間投与 クラリスロマイシン(200) 2×1 熱発時アセトアミノフェン 0.4g 頓用
------	------	----	----	---