

R8.4月

治療 開始日	治療 終了日	期間	所定疾患傷病名	処置等の内容
4月7日	4月11日	5日	尿路感染症	kT36.4℃ 検尿：亜硝酸（-） 潜血（2+） 白血球（-） Dr診察 尿路感染症の診断 止血剤5日間投与 Rpトランサミン（250）3T／3×1 経過観察へ
4月16日	4月22日	7日	尿路感染症	kT39.3℃ 検尿：亜硝酸（+） 蛋白（2+） 潜血（-） 尿蛋白(2+) Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤7日間投与 Rpノルフロキサシン(100) 3T／3×1 経過観察へ
4月1日	4月10日	10日	尿路感染症	KT37.6℃ 検尿：亜硝酸(-) 蛋白(+) 潜血(-)白血球(+) Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤10日間投与 Rp)ノルフロキサシン(100)3T/3×1 レバミピド(100)3T/3×1 経過観察へ
4月5日	4月7日	3日	蜂窩織炎	KT39.4℃ 右大腿子部発赤、熱感あり Dr診察 蜂窩織炎の診断 抗生剤3日間投与 Rp)ピクシリンS配合錠3T/3×1 経過観察へ

R8.5月

治療 開始日	治療 終了日	期間	所定疾患傷病名	処置等の内容
5月2日	5月5日	4日	尿路感染症	体温39.7℃ 解熱剤アセトアミノフェン0.4g投与 検尿 硝酸（-）、尿たんぱく（2+） 潜血（-）、白血球（+） Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤・胃薬4日間投与 ノルフロキサシン（100）3錠 レバミピド（100）3錠 3×1 経過観察へ
5月5日	5月7日	3日	蜂窩織炎	KT39.2℃ 悪寒戦慄あり 左大腿部発赤 Dr診察：蜂窩織炎の診断 抗菌剤3日間投与 Rp)ピクシリンS配合錠3T 3×1 熱発時アセトアミノフェン0.4投与 経過観察へ

R8.6月

治療 開始日	治療 終了日	期間	所定疾患傷病名	処置等の内容
6月4日	6月7日	4日	尿路感染症	kT39.0℃ 検尿：亜硝酸（-）蛋白（±）潜血（+） 白血球(+) Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤・胃薬4日間投与 Rp)ノフロキサシン(100)) 3T レバミピド(100)3T / 3×1 経過観察へ
6月21日	6月25日	5日	尿路感染症	kT38.0℃ 数日前より血尿あり 検尿：亜硝酸（+）蛋白（4+）潜血（3+） 白血球(3+) PH(9) Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤・抗ブラスミン薬5日間投与 Rp)ノフロキサシン(100)) 3T トランサミン(250) 3T / 3×1 経過観察へ
6月29日	6月30日	2日	肺炎	kT37.2℃ 数日前より、白色粘稠痰吸引度々施行 胸部レントゲン検査 結果：肺炎像所見あり Dr診察 肺炎の診断 抗菌剤・去痰剤5日間投与 Rp)ピクシリンS配合錠(100)) 3T カルボシステイン(500) 3T / 3×1 経過観察へ
6月11日	6月18日	8日	蜂窩織炎	6/10、20時KT39.0度の発熱あり 右大腿部～右臀部に発赤・熱感認む 6/11、Dr診察 蜂窩織炎の診断 抗生剤7日間投与 ピクシリンS配合錠3錠 3×1、朝昼夕 経過観察へ
6月18日	6月22日	5日	肺炎	6/17、15：29 振戦出現 KT38.0℃発熱、 咳嗽（+）吸引施行、淡黄色～白色痰中等量除去アセチルアミノフェン頓用投与にて解熱するも喀痰多し Dr診察 肺炎の診断 抗生剤、去痰剤、鎮咳剤 5日間投与 ピクシリンS配合錠3T、カルボシステイン3T、レスブレン3T ／ 3×1、朝昼夕 経過観察へ
6月18日	6月22日	5日	肺炎	6/13～感冒症状出現 総合感冒剤、抗生剤、鎮咳剤処方 PL配合顆粒、ピクシリンS配合錠、レスブレン 内服開始するも症状軽減せず 6/18 Dr診察 肺炎の診断 マクロライド系抗生剤に変更クラリスロマイシン（200）2T／日去痰剤、抗ブラスミン薬、胃薬 5日間処方 （カルボシステイン、トランサミン、レバミピド） 経過観察へ
6月19日	6月23日	5日	尿路感染症	排尿時痛(+) 検尿：亜硝酸塩（2+）蛋白（±） 潜血(-)白血球（2+） Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤5日間投与 Rp)ノフロキサシン(100)3T/ 3×1 経過観察へ
6月22日	6月26日	5日	肺炎	6/19より発熱持続 KT38℃～39℃（特に夜間） 咳嗽、咽頭痛等の呼吸器症状（-） Dr診察 BX-P施行 肺炎の診断 抗菌剤5日間投与 RP)ノフロキサシン(100)3T/3×1 経過観察へ

R8.7月

治療 開始日	治療 終了日	期間	所定疾患傷病名	処置等の内容
7月11日	7月13日	3日	尿路感染症	kT38.1℃ 時々血尿あり 検尿：亜硝酸（－）蛋白（3＋）潜血（＋） 白血球（＋）PH(9) Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤・胃薬3日間投与 Rp)ピクシリン配合錠3T レバミピド(100)3T / 3×1 経過観察へ
7月27日	7月31日	5日	尿路感染症	kT38.5℃ 検尿：亜硝酸（＋）蛋白（2＋）潜血（2＋） 白血球（3＋）PH(7) Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤・胃薬5日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T レバミピド(100)3T / 3×1 経過観察へ
7月27日	7月30日	4日	尿路感染症	kT36.6℃ 血尿あり 検尿：亜硝酸（－）蛋白（4＋）潜血（3＋） 白血球（3＋）PH(9) Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤・胃薬4日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T レバミピド(100)3T / 3×1 経過観察へ
7月2日	7月7日	6日	尿路感染症	1週間程前から排尿時痛（＋）検尿施行。 亜硝酸（2＋）、ケトン体（－）、蛋白（±）、 糖（2＋）、潜血（±）、白血球（＋）。 Dr診察 尿路感染症の診断 抗菌剤内服5日分投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T / 3×1 経過観察
7月3日	7月7日	5日	蜂窩織炎	右耳介～右頸部発赤、熱感あり KT38.6℃ Dr診察 蜂窩織炎の診断 抗菌剤5日間投与 Rp)ノフロキサシ(100)3T 3×1 経過観察へ
7月15日	7月24日	10日	肺炎	悪寒あり KT39.5℃ 検尿：亜硝酸塩（－）蛋白（＋） 潜血(2+)白血球（－） Dr診察 肺炎の診断 抗生剤10日間投与 Rp)ピクシリンS配合錠3T / 3×1 経過観察へ